



Novo mesto
Slovenija

Prije uzimanja lijeka pažljivo pročitajte uputu o lijeku.

-Ovaj je lijek dostupan bez recepta i predviđen je za ublažavanje lakših tegoba koje ne zahtijevaju savjetovanje s liječnikom. Unatoč tome morate ga uzimati pažljivo i odgovorno kako biste imali što veću korist od njega.

-Kod prvog posjeta liječniku recite da uzimate ovaj lijek.

-Ako simptomi Vaše bolesti ostanu isti i nakon 3 dana, morate posjetiti liječnika.

-Čuvajte ovu uputu jer Vam može ponovno zatrebati.

-Ako imate dodatna pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan Vama osobno i ne smijete ga davati drugima jer im može štetiti čak i ako imaju simptome jednake Vašima.

Septolete[®] D

**antiseptik za usta i ždrijelo
bez šećera**

Sastav

1 pastila sadržava 1,0 mg benzalkonij-klorida (benzalkonii chloridum), 1,2 mg levomentola (levomentolum), 1,0 mg eteričnog ulja paprene metvice (Menthae piperitae aetheroleum), 0,6 mg eteričnog ulja eukaliptusa (Eucalypti aetheroleum) i 0,6 mg timola (thymolum).

Pomoćne tvari: titan-dioksid (E 171), boja kinolin žuta (E 104), maltitol, manitol, glicerol.

Farmaceutski oblik i veličina pakiranja

Pastila.

30 (2x15) pastila u blisteru.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

KRKA - FARMA d.o.o., Radnička cesta 48, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Proizvođač

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

Način i mjesto izdavanja

Bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima i medicinskim proizvodima.

Kako Septolete D djeluju

Septolete D pastile sadržavaju benzalkonij-klorid koji djeluje kao antiseptik svojim djelovanjem uništava niz bakterija i neke gljivice. Mentol i eterično ulje paprene metvice smanjuju osjećaj bola i tako olakšavaju subjektivne tegobe kao što su pečenje i bol pri gutanju, a ujedno daju pastilama ugodan i osvježavajući okus. Slično kao benzalkonij-klorid, i timol djeluje antiseptički te dodatno doprinosi povećanoj djelotvornosti. Eukaliptusovo eterično ulje pospješuje izlučivanje sluzi u gornjim dišnim putevima i tako olakšava disanje. Septolete D pastile djelotvorno olakšavaju tegobe pri infektivnim i upalnim bolestima usta i ždrijela.

Septolete D pastile ne sadrže šećer potreban rast bakterija, pa stoga ne utječu na kvarenje zubi.

Kada koristite Septolete D

Septolete D pastile se koriste za olakšavanje boli i dezinfekciju:

- pri blažim infekcijama u usnoj šupljini i ždrijelu,
- za zaštitu pri prehladama i gripoznim stanjima,
- pri upali desni i usne sluznice te
- pri promuklosti i neugodnom zadahu.

Kada Septolete D ne smijete uzimati

Septolete D pastile ne smijete uzimati kod preosjetljivosti (alergije) na bilo koji sastojak lijeka.

Mjere opreza i upozorenja

Septolete D pastile se ne preporučuju djeci mlađoj od 4 godine.

Uzimanje većih doza od propisanih nije preporučljivo.

Pri dugotrajnoj promuklosti posavjetujte se sa svojim liječnikom.

Kod težih infekcija koje prati visoka temperatura, glavobolja i povraćanje potrebno je posavjetovati se s liječnikom, posebica ako se tegobe ne poboljšavaju nakon tri dana.

Dijabetičari moraju znati da svaka pastila sadržava oko 0,8 g maltitola. Za metaboliziranje maltitola je potreban inzulin, ali je zbog spore hidrolize i apsorbcije u probavnom sustavu potreba za inzulinom mala.

Posebna upozorenja o pomoćnim tvarima

Glicerol u velikim dozama može prouzročiti glavobolju i želučano-crijevne poremećaje.

Pastile sadržavaju poliole (maltitol, manitol) koji u velikim dozama mogu prouzročiti proljev, osobito kod djece.

Međusobno djelovanje lijekova

Uzimate li druge lijekove, posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

Pastile se ne smiju uzimati istovremeno s mlijekom jer ono smanjuje protumikrobnu djelotvornost benzalkonij-klorida.

Posebna upozorenja

Trudnoća i dojenje

Posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom prije nego uzmete bilo koji lijek.

O neškodljivosti lijeka tijekom trudnoće i dojenje nema dovoljno podataka, stoga se primjena u tim razdobljima ne preporučuje.

Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima

Nije poznato da bi pastile Septolete D utjecale na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Doziranje i način primjene

Po 1 pastilu rastopite u ustima svaka 2 do 3 sata. Djeci od 4. godine nadalje preporučuje se do 4 pastile, a od 10. godine nadalje do 6 pastila na dan. Odraslima i djeci starijoj od 12 godina preporučuje se do 8 pastila na dan. Pastile se ne preporučuju djeci mlađoj od 4 godine. *Smatrate li da je učinak lijeka prejak ili preslab, posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.* Septolete D ne uzimajte neposredno prije obroka i istovremeno s mlijekom. *Ne uzimajte dvostruku dozu ako ste zaboravili uzeti prijašnju dozu.*

Postupci u primjeru predoziranja

Ukoliko ste uzeli veću dozu lijeka nego što biste smjeli, odmah se posavjetujte s liječnikom ili ljekarnikom.

Glede količine djelatnih tvari u jednoj pastili, mogućnost predoziranja je minimalna. Pri uzimanju veće količine pastila može doći do želučano-crijevnih tegoba, mučnine, povraćanja i proljeva. U takvom slučaju prestanite s uzimanjem, popijte puno vode ili mlijeka i posavjetujte se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

Nuspojave

Kao svi lijekovi, i Septolete mogu imati nuspojave.

U propisanoj dozi Septolete pastile samo vrlo rijetko imaju neželjenih učinaka. U osjetljivih osoba uzimanje većih doza od propisanih može dovesti do želučano-crijevnih tegoba.

O svakoj nuspojavi obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

Rok valjanosti i čuvanje

Lijek čuvajte izvan dohvata i pogleda djece!

Lijek ne smijete upotrebljavati nakon isteka roka valjanosti koji je naveden na pakiranju. Lijek čuvajte pri temperaturi do 25°C, zaštićeno od vlage i svjetlosti.

Datum zadnje revizije upute

16. lipnja 2008.

Broj i datum rješenja o odobrenju za stavljanje lijeka u promet u Republici Hrvatskoj

UP/I-530-09/04-02/113 od 26. studenog 2004.