



Novo mesto

Slovenija

Prije uzimanja lijeka pažljivo pročitajte uputu o lijeku.

Ovaj se lijek može dobiti bez recepta. Unatoč tome, morate ga koristiti pozorno i brižno da bi vam najbolje koristio.

- *Čuvajte ovu uputu o lijeku jer Vam može ponovno zatrebati.*
- *Ako imate dodatna pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.*
- *Ne poboljšaju li se simptomi vaše bolesti nakon 3 dana, obavezno posjetite liječnika.*

Septolete[®] plus

**dvostruki učinak
za bolno grlo
antiseptik**

Sastav

1 pastila sadržava 5 mg benzokaina i 1 mg cetilpiridin-klorida.

Pomoćne tvari: maltitol, tekući, saharoza, manitol, glicerol, titan-dioksid (E 171), plava boja (E 131).

Farmaceutski oblik i veličina pakiranja

18 (2 x 9) pastila u blister pakiranju (PVC/PVDC//Al).

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

KRKA-FARMA d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 48, Hrvatska

Proizvođač

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Slovenija

Način i mjesto izdavanja

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

Kako Septolete plus djeluju

Septolete plus pastile djeluju lokalno analgetski i antimikrobno. Pastile djeluju antiseptički u usnoj šupljini i ždrijelu, te lokalno ublažavaju bol.

Pastile sadržavaju antiseptik cetilpiridin-klorid koji uništava niz bakterija i gljivica, a u određenoj mjeri koči i razvoj virusa. Na taj način ublažava upale u usnoj šupljini i ždrijelu, posebice pak sprječava razvoj težih bakterijskih upala. Zahvaljujući dobroj sposobnosti vlaženja i smanjenoj površinskoj napetosti cetilpiridin-klorid također prodire u teško dostupne dijelove sluznice usne šupljine i ždrijela, te sprječava rast bakterija.

Benzokain je lokalni anestetik, primjeren za olakšavanje boli pri gutanju koja često prati infekcije i upale u ustima i ždrijelu.

Pastile Septolete plus sadržavaju poliole maltitol i manitol. Ne sadržavaju šećer koji bakterije trebaju za rast. Pastile Septolete plus primjerene su za dijabetičare, ne kvare zube, a učinak antiseptika je u podlozi bez šećera bolji.

Kada koristiti Septolete plus

Pastile Septolete plus djeluju antiseptički i koriste se za ublažavanje boli:

- pri blažim infekcijama u usnoj šupljini (faringitis, laringitis, početak angine),
- pri upali desni i usne sluznice (gingivitis, stomatitis).

Kada Septolete plus ne smijete uzimati

Lijek ne smijete uzimati ako ste alergični na bilo koji sastojak lijeka.

Mjere opreza i upozorenja

Septolete plus ne preporučuju se djeci mlađoj od 12 godina.

Uzimanje većih doza od propisanih nije preporučljivo.

Ako imate šećernu bolest morate znati da svaka pastila sadržava oko 1 g maltitola. Zbog spore hidrolize i apsorpcije u probavnim organima, maltitol samo malo utječe na nivo krvnog šećera.

Uzimanje Septoleta plus zajedno s hranom i pićem

Septolete plus ne uzimajte neposredno prije obroka i istovremeno s mlijekom.

Posebna upozorenja o pomoćnim tvarima

Pastile sadržavaju poliole (maltitol, manitol) koji u velikim dozama mogu prouzročiti proljev, posebice u djece.

Trudnoća i dojenje

Posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom prije nego uzmete bilo koji lijek.

Kako su podaci o sigurnosti lijeka tijekom trudnoće i dojenja ograničeni, ne preporučuje se njegovo uzimanje u tom razdoblju.

Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima

Nije poznato da bi pastile Septolete plus utjecale na psihofizičku sposobnost upravljanja vozilima ili strojevima.

Međusobno djelovanje lijekova

Nije poznato.

Doziranje i način primjene

Odraslima i djeci starijoj od 12 godina preporučuje se do 8 pastila na dan. Po 1 pastilu otopite u ustima svaka 2 do 3 sata.

Postupanje u slučaju predoziranja

Ukoliko ste uzeli veću dozu lijeka no što biste smjeli, posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

Glede količine djelatnih tvari u jednoj pastili, mogućnost predoziranja je minimalna. Pri uzimanju veće količine pastila može doći do želučano-crijevnih tegoba, mučnine, povraćanja i proljeva. U takvom slučaju prestanite s uzimanjem, popijte puno vode ili mlijeka i posavjetujte se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

Nuspojave

Kao svi lijekovi, i Septolete plus mogu imati nuspojava.

U propisanoj dozi, pastile Septolete plus samo vrlo rijetko imaju nuspojave. U osjetljivih osoba uzimanje većih doza od propisanih dovodi do želučano-crijevnih tegoba zbog podraživanja sluznice probavnih organa.

U rijetkim slučajevima može doći do alergijskih reakcija u osoba koje su preosjetljive na bilo koji sastojak lijeka.

O svakoj nuspojavi obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

Rok valjanosti

Lijek čuvajte izvan dohvata i pogleda djece!

Lijek ne smijete upotrebljavati nakon isteka roka valjanosti koji je naveden na pakiranju.

Čuvati pri temperaturi od 25°C, zaštićeno od vlage i svjetlosti.

Datum zadnje revizije upute

16. lipnja 2008.

Broj i datum rješenja o odobrenju za stavljanje lijeka u promet u Republici Hrvatskoj

Septolete plus: UP/I-530-09/05-01/847 od 07. rujna 2005.