



Novo mesto
Slovenija

Prije uzimanja lijeka pažljivo pročitajte uputu o lijeku.

Ovaj se lijek može dobiti bez recepta. Unatoč tome, morate ga koristiti pozorno i brižno da bi vam najbolje koristio.

- Čuvajte ovu uputu o lijeku jer Vam može ponovno zatrebati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
- Ne poboljšaju li se simptomi vaše bolesti nakon 3 dana, obavezno posjetite liječnika.

Uputa o lijeku sadrži slijedeće podatke:

1. Što su Septolete divlja trešnja i za što se koriste?
2. Što morate znati prije početka uzimanja Septoleta divlja trešnja?
3. Kako ćete uzimati Septolete divlja trešnja?
4. Moguće nuspojave
5. Čuvanje Septoleta divlja trešnja

Septolete® divlja trešnja
Cetylpyridinium

Antiseptik za usnu šupljinu i ždrijelo s okusom divlje trešnje

- Djelatna tvar je cetilpiridin-klorid.
- Pomoćne tvari su: maltitol tekući, manitol, levomentol, eterično ulje limuna, glicerol, djevičansko ricinusovo ulje, silicij-dioksid, bezvodni, magnezij - stearat, polivinilpirolidon, capol 600, titan - dioksid (E171), maltitol, aroma divlje trešnje, boja ljubičasta (E120).

Farmakoterapijska skupina

Preparat za ždrijelo, antiseptik.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

KRKA - FARMA d.o.o., Radnička cesta 48, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Proizvođač

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

Način i mjesto izdavanja

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima i medicinskim proizvodima.

1. ŠTO SU SEPTOLETE DIVLJA TREŠNJA I ZA ŠTO SE KORISTE?

Svaka pastila sadrži 1,2 mg cetilpiridin-klorida.

Pastile su dostupne u kutijama od 18 pastila. Kutija sadrži 2 blistera sa po 9 pastila. Pastile su ljubičaste, okrugle i blago izbočene.

Septolete divlja trešnja imaju lokalno antimikrobno djelovanje. Sadrže antiseptik cetilpiridin-klorid koji djeluje protiv mnogih bakterija i gljivica, te u određenoj mjeri, sprječava razvoj virusa. Pastile djeluju antiseptički u usnoj šupljini i ždrijelu ublažavajući tako upalu, ali sprječavaju i razvoj težih bakterijskih upala.

Zahvaljujući dobroj sposobnosti vlaženja i smanjenoj površinskoj napetosti, cetilpiridin-klorid također prodire u teško dostupne dijelove sluznice usne šupljine i ždrijela, te sprječava rast bakterija.

Septolete divlja trešnja imaju ugodan i osvježavajući okus divlje trešnje. Ne sadrže šećer koji bakterijama treba za rast pa zbog toga ne uzrokuju propadanje zubi. Antiseptički učinak je puno bolji s osnovom koja ne sadrži šećer.

Pastile se preporučuju:

- za lokalno liječenje blažih infekcija usne šupljine i ždrijela (faringitis, laringitis, početak angine)
- kod upale desni i sluznice usne šupljine (stomatitis, gingivitis)
- kod simptoma prehlade i gripe kao što su bol, suhoća i grebanje u ždrijelu
- kod promuklosti i lošeg zadaha

2. ŠTO MORATE ZNATI PRIJE POČETKA UZIMANJA SEPTOLETA DIVLJA TREŠNJA?

Ne uzimajte Septolete divlja trešnja:

- ako ste preosjetljivi na cetilpiridin-klorid ili bilo koji drugi sastojak Septoleta divlja trešnja

Budite posebno oprezni pri uzimanju Septoleta divlja trešnja:

- ako imate otvorene rane u usnoj šupljini jer cetilpiridin-klorid usporava cijeljenje rana.
- ako imate teške infekcije praćene visokom temperaturom, glavoboljom i povraćanjem. Obratite se liječniku, posebno ako se stanje nakon 3 dana ne poboljša.
- ako imate šećernu bolest, trebate imati na umu da svaka pastila sadrži oko 1 g maltitola. Zbog spore hidrolize i apsorpcije u probavnom traktu maltitol ima slab učinak na razinu šećera u krvi.

Ne preporuča se uzimanje većih doza od propisanih.

Pastile se ne preporučuju djeci mlađoj od 4 godine.

Uzimanje drugih lijekova

Obavijestite svojeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koji lijek, čak i ako ste ga nabavili bez recepta.

Septolete divlja trešnja nemaju učinka na druge lijekove.

Uzimanje Septoleta divlja trešnja s hranom i pićem

Ne preporučuje se uzimanje pastila neposredno prije obroka i zajedno s mlijekom.

Posebna upozorenja

Posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom prije uzimanja bilo kojeg lijeka.

Trudnoća

Kako su podaci o sigurnosti lijeka tijekom trudnoće ograničeni, ne preporučuje se uzimati ga tijekom trudnoće.

Dojenje

Kako su podaci o sigurnosti lijeka tijekom dojenja ograničeni, ne preporučuje se uzimati ga tijekom dojenja.

Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima

Septolete divlja trešnja nemaju nikakvog učinka na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Važni podaci o nekim sastojcima Septoleta divlja trešnja

Pastile sadrže prirodnu boju zbog čega mogu izbljediti tijekom vremena ako se drže na svjetlu. Pastile sadrže poliole (maltitol, manitol) koji kod velikih doza mogu uzrokovati proljev. Velike doze glicerola mogu uzrokovati glavobolju i probavne smetnje.

3. KAKO ĆETE UZIMATI SEPTOLETE DIVLJA TREŠNJA?

Uvijek uzimajte lijek prema uputama liječnika. Ako niste sigurni kako uzimati lijek, obratite se liječniku ili ljekarniku.

Uobičajena doza za odrasle i djecu stariju od 12 godina je do 8 pastila na dan. Otopite 1 pastilu u ustima svaka 2 do 3 sata.

Za djecu stariju od 4 godine preporučuje se uzimanje do 4 pastile dnevno, dok se za djecu u dobi od 10 do 12 godina preporučuje uzimanje do 6 pastila dnevno. Otopite 1 pastilu u ustima svaka 3 do 4 sata.

Nemojte uzimati pastile neposredno prije ili tijekom obroka.

Ako smatrate da je učinak Septoleta divlja trešnja prejak ili preslab, posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

Ako ste uzeli veću dozu Septoleta divlja trešnja nego što smijete

Vezano uz količinu djelatnih tvari u jednoj pastili, mogućnost predoziranja je minimalna. Pri uzimanju veće količine pastila može doći do želučano-crijevnih tegoba, mučnine, povraćanja i proljeva. U takvom slučaju, prestanite s uzimanjem, popijte puno vode ili mlijeka i posavjetujte se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

Ako ste zaboravili uzeti Septolete divlja trešnja

Ne uzimajte dvostruku dozu kako bi nadoknadili dozu koju ste zaboravili.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi lijekovi, i Septolete divlja trešnja mogu imati nuspojava.

U propisanoj dozi, pastile Septolete divlja trešnja vrlo rijetko imaju neželjenih učinaka. U osjetljivih osoba uzimanje većih doza od propisanih dovodi do želučano-crijevnih tegoba zbog podraživanja sluznice probavnih organa.

U vrlo rijetkim slučajevima može doći do alergijskih reakcija u osoba koje su preosjetljive na bilo koji sastojak lijeka.

O svakoj nuspojavi obavijestite svoga liječnika ili ljekarnika.

5. ČUVANJE SEPTOLETA DIVLJA TREŠNJA

Lijek čuvajte izvan dohvata djece!

Čuvati pri temperaturi do 25°C, u originalnom pakiranju zaštićeno od vlage i svjetla.

Lijek ne smijete upotrebljavati nakon isteka roka valjanosti koji je naveden na pakiranju.

Datum zadnje revizije upute

15. svibnja 2007.

Broj i datum rješenja o odobrenju za stavljanje lijeka u promet u Republici Hrvatskoj

Septolete divlja trešnja :UP/I-530-09/06-01/227 od 31. svibnja 2007.